

Грипп птиц и меры его профилактики

Грипп птиц - острая инфекционная вирусная болезнь, которая может поражать все виды птиц, а также отдельные виды животных.



Возбудителем гриппа птиц является вирус гриппа типа А. Существует более 10 подтипов вируса. С позиций здравоохранения, наиболее опасными для человека являются штаммы H7N9, H5N6, H5N1.

Особо опасные для человека вирусы гриппа птиц были выявлены в Китае (H7N9, H5N7), в некоторых странах Азии и Африки (H5N1).

Природным резервуаром вируса являются мигрирующие водоплавающие птицы (преимущественно утки, гуси, чайки и пр.), заболевание у которых протекает бессимптомно. Инфицирование домашней птицы происходит при ее контакте с дикой водоплавающей, а также синантропной птицей (голуби, вороны, воробьи и пр.).

К вирусу восприимчива домашняя птица: куры, индейки, утки, фазаны, цесарки, перепела, а также экзотические и декоративные птицы.

Симптомы заболевания домашней птицы следующие:

- снижение яйценосности;
- нарушение координации движений (вращательное движение головой), искривление шеи;
- угнетенное состояние;
- почернение гребня и сережек;
- хриплое, затрудненное дыхание;
- гибель птицы в течение 24-72 часов.

Инфицирование человека происходит несколькими путями:

- при тесном контакте с инфицированной живой и/или мертвой птицей;
- при нахождении человека в помещениях, в которых содержится больная птица;
- при купании человека в водоеме, инфицированном выделениями птиц, а также при питье такой воды;
- при употреблении в пищу мяса птицы и яиц, не прошедших достаточную термическую обработку.

Инкубационный период заболевания составляет в среднем 2-8 дней, однако, может длиться до 17 суток.

Заболевание человека характеризуется:

- ознобом;
- повышением температуры тела до 38°C и выше;
- головными, мышечными болями и болями в горле;
- кашлем, часто с примесью кровянистой мокроты, одышкой, затрудненным дыханием;

-неоднократной рвотой и жидким стулом.

У многих болезнь вызываемая вирусом А(Н5N1) имеет чрезвычайно агрессивное течение с быстрым ухудшением состояния и высокой смертностью.

При появлении первых признаков заболевания следует немедленно обратиться к врачу для установления диагноза и назначения адекватного и своевременного лечения, так как позднее начало лечения неизбежно приводит к развитию опасных для жизни осложнений.

Для профилактики гриппа птиц необходимо:

-избегать контакта с дикой водоплавающей и синантропной птицей;

-не подбирать и не трогать больную или павшую домашнюю, декоративную и дикую птицу;

-не покупать мясо птицы и яйца в несанкционированных местах торговли;

-соблюдать правила хранения пищевых продуктов в бытовом холодильнике – не хранить мясо птицы и яйца с продуктами, которые не подвергаются термической обработке (овощами, фруктами, сыром, колбасой, кондитерскими изделиями и пр.);

-употреблять в пищу мясо птицы и яйца только после достаточной термической обработки: яйца варить не менее 6 минут, мясо - не менее 30 минут при температуре 100°C;

-содержать домашнюю птицу на частных подворьях или в специально огороженных вольерах, исключающих возможность контакта с дикой и синантропной птицей;

-ухаживать за домашней птицей в специально выделенной для этих целей рабочей одежде (халат, передник, рукавицы, обувь). В период контакта с птицей (кормление, уборка помещений и пр.) нельзя пить, принимать пищу, курить.

В случае выявления признаков заболевания у птицы немедленно информировать об этом ветеринарную службу.